

Grandes Cultures

Service Régional de la Protection des Végétaux Site de Marmilhat BP 45

Site de Marmilhat BP 45 63370 LEMPDES Tél. 04.73.42.14.83 Fax 04.73.42.16.76 www.srpv-auvergne.com

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur gérant : D. DIDELOT

Publication périodique C.P.P.A.P n°2315AD ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 € Fax : 50 € Internet : 45 €

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°19 du 20 juin 2002 – 1 page

Maïs : Pyrale

Traitement trichogramme.

> Tournesol : Régression des pucerons

BLE

Stade: Amande aqueuse (10.5.4) à grain farineux (11.2).

Les conditions climatiques observées depuis maintenant une semaine sont très défavorables à un bon remplissage du grain.

TOURNESOL

Stade: six paires de feuilles à boutons dégagés.

Pucerons

Grâce aux auxiliaires, les populations de pucerons régressent et ne sont plus nuisibles dans la majorité des parcelles.

Mildiou

Cette maladie qui peut provoquer de gros dégâts devient très rare. En effet, l'extension de la culture de variété résistante permet de maîtriser les risques.

Sclérotinia

Le sclérotinia sur les boutons floraux est un peu plus observé que les années précédentes.

Phomopsis

Nous sommes dans une région où le risque est très faible et les symptômes relativement rares. Le choix d'une variété peu sensible ou très peu sensible est suffisant pour maîtriser le risque.

Avec un bon choix variétal, les traitements en végétation vis à vis des maladies du tournesol ne sont jamais justifiés et rentabilisés.

MAÏS

Stade: 9 à 12 feuilles.

Pyrale

Bilan des captures au 19 juin :

lieu	1 ^{eres} captures	Total captures
Lempdes (63)	-	0
Pagnant (63)	14/06	2
La Ferté	18/06	4
Boucé	11/06	7
Etroussat	10/06	1
Bellenave	14/06	1
Charmes	-	0
Escuroles	14/06	1
St Didier la Foret	10/06	3

Les précipitations importantes du début du mois et les températures élevées ont permis un début de vol précoce. La première ponte a été observée en début de semaine à St Didier.

Avec le retour des précipitations, le vol pourrait se généraliser rapidement.

Le traitement trichogramme est à mettre en place rapidement.

Le traitement avec un insecticide liquide devra être positionné au stade limite passage du tracteur (dans les parcelles précoces, ce stade sera atteint rapidement).

Le traitement avec insecticide micro-granulé ne sera pas positionné avant le premier juillet. Les prochaines observations permettront de fixer les dates de traitement dans le prochain bulletin.

Pucerons

Les populations progressent dans certaines parcelles sans justifier d'intervention spécifique.



